

Etevan toimintaohje Covid-19 pandemian eri tilanteisiin

Sisällys

1	Toiminta yksikössä - Tartuntojen ennaltaehkäisy.....	2
1.1	Asiakastyö.....	2
1.2	Henkilöstö	3
1.3	Suojautuminen	3
2	Toiminta yksikössä, jossa epäillään koronaviruksen aiheuttamaa infektiota	4
2.1	Asiakastyö.....	4
2.2	Henkilöstö	5
2.3	Suojautuminen	5
3	Toiminta yksikössä, kun on todettu koronaviruksen aiheuttama infektio	6
3.1	Asiakastyö.....	6
3.2	Suojautuminen	6
4	Suojaimet	6
4.1	Suojainten käyttö erityistilanteissa.....	6
4.2	Suojainten pukeminen ja riisuminen	7
4.3	Suojainten hankinta.....	7
5	Koronatestaus	9
5.1	Asiakkaiden koronatestaus	9
5.2	Henkilöstön koronatestaus pikatesteillä.....	9
5.3	Henkilöstön näytteenoton ajanvaraus Koronabotissa.....	9
6	Muita ohjeita COVID19 –positiivisen tai –epäilyn hoitoon.....	10
6.1	Ruokailu	10
6.2	Siivous.....	10
6.3	Jätteiden käsittely	10
6.4	Likapyykki	10
6.5	Tutkimus- ja hoitovälineistö	11
	Yhteystiedot	11
	Lähteet	11

1 Toiminta yksikössä - Tartuntojen ennaltaehkäisy

- Huolehditaan henkilökunnan ja asiakkaiden suojaumisesta asianmukaisesti ja varmistetaan hygieniatarvikkeiden ja suojainten saatavuus
- **Siivoukseen** kiinnitetään erityistä huomiota.
 - viikoittain: asukashuoneet.
 - päivittäin: yhteiskäytössä olevat saniteettitilat sekä seuraavat kosketuspinnat: yksikön keittiö, yhteisten tilojen (myös henkilökunnan tilojen) kaiteet, kahvat, käsinojat, valokatkaisijat, kaukosäätimet yms., koronapositiivisen tai –epäilyn asukkaan huoneen pinnat. Joka asukkaan välillä: yhteiskäytössä olevat hoitovälineet desinfioidaan. Välittömästi: eritetahrat poistetaan kaksivaiheisella eritetahradesinfektiolla.
 - siivouksessa käytetään kestohanskoja, jotka desinfioidaan käytön jälkeen ja säilytetään erillään.
- Muiden toimintayksikön ulkopuolisten toimijoiden (esim. tietohallinto, kiinteistöhuolto) käynnit sovitaan esihenkilön kanssa. Toimintayksiköt valvovat vierailijoiden koronatartunnan ehkäisyyn annettujen ohjeiden noudattamista.
- Huolehditaan, että henkilöstö, asiakkaat, omaiset ja muut yksikössä työtä tekevät ovat tietoisia tartuntatautilanteesta.

1.1 Asiakastyö

Vierailut asiakkaan luo tapahtuvat asiakkaan omassa huoneessa tai ulkona. Yhteisten tilojen käyttöä vierailuihin tulee välttää.

- vierailujen ajan on huolehdittava hyvästä käsihygieniasta
 - vierailijoille suositellaan maskin käyttöä
 - turvavälit on säilytettävä muihin asukkaisiin ja henkilökuntaan,
 - vierailulle ei saa tulla, jos tuntee hengitystieinfektion tai muun virussairauden oireita.
 - jos asiakas on asetettu tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin tai eritykseen, vierailuja voidaan rajoittaa
- **Asiakkaan palatessa kotilomalta**, seurataan asiakkaan terveydentilaa ja mahdollisia oireita ja mikäli asukkaalle tulee pieniäkin oireita, otetaan asukkaalta koronatesti. Jos omaiset kertovat mahdollisesta altistumisesta, asiakas testataan.
 - **Uudet asiakkaat** testataan paikallisen riskinarvion mukaan. Tämä koskee myös täysin rokotettuja henkilöitä.
 - **Välttämätöntä** palvelua antavien henkilöiden, kuten kuntoutustyöntekijöiden tai henkilökohtaisten avustajien vieraillessa toimintayksikössä, huolehditaan koronatartunnan ehkäisyyn annettujen ohjeiden noudattamisesta.
 - **Vältetään** asukkaiden siirtämistä hoitopaikasta tai yksiköstä toiseen, jos se ei ole heidän hoitonsa turvaamiseksi välttämätöntä.
 - **Konsultoidaan** tarvittaessa asiakkaan omaa lääkäriä, infektiolääkäriä tai kunnan tartuntataudeista vastaavaa lääkäriä.
 - **Hoidon rajauksia** koskevat päätökset tehdään yhteisymmärryksessä asiakkaan kanssa, tarvittaessa omaisia kuullen. Lääketieteellisten perusteiden mukainen hoito on järjestettävä, samoin jatkohoito erikoissairaanhoidon jälkeen.

30.9.2022

1.2 Henkilöstö

- Oman, työkavereiden ja asiakkaitten turvallisuuden varmistamiseksi työntekijän tulee huolehtia, että **rokotussuoja on kunnossa**. Työntekijät, viranhaltijat ja opiskelijat osoittavat työnantajalle luotettavan kirjallisen selvityksen rokotesuojasta.
- Jos työntekijä ei ole osoittanut suojaa covid-19 –tautia vastaan, työnantaja tarjoaa ensisijaisesti työntekijälle muuta hänen työsopimuksen mukaista työtä tai muuta koulutusta, kokemusta tai ammattitaitoa vastaavaa työtä. Jos sopivaa työtä ei ole tarjolla tai työntekijä kieltäytyy työnantajan tarjoamasta työstä, työnantajalla ei ole palkanmaksuveloitetta.

Katso tarkemmin TARTUNTATAUTILAIN VÄLIAIKAISEN 48 A §:n SOVELTAMINEN ETEVASSA

• Töihin tullaan vain terveenä

- Henkilöstön on hyvä käyttää eri vaatekertoja työssä ja kotona, koska sillä vältetään infektioaikana virusten kulkeutuminen kodin ja työpaikan välillä. Työssä käytettävät vaatteet voi pestä toimintayksikön pesukoneessa pesuohjeiden mukaisesti.
- Henkilöstön vaihtuvuus pidetään mahdollisimman vähäisenä.
- Vapaa-ajan ulkomaanmatkoilta palatessa on noudatettava valtakunnallisia THL :n ja ulkoministeriön ohjeita sekä Etevan poissaolo- ohjetta.

1.3 Suojautuminen

- Normaalioloissa (= ei koronatartuntaepäilyjä, tartuntoja, oireita) hengityssuojaimia ei tarvitse käyttää asiakastyössä.
- Kirurgisia suu- nenäsuojaimia tulee olla yksikössä saatavilla, jos työntekijä, omainen tai asiakas haluaa niitä käyttää.
- FFP 2 –suojainta käytetään aina aerosoleja tuottavien toimenpiteiden yhteydessä

30.9.2022

2 Toiminta yksikössä, jossa epäillään koronaviruksen aiheuttamaa infektiota

Koronavirus tarttuu pisaratartuntana henkilön yskiessä, aivastaessa tai kosketustartuntana. Koronaviruksen itämisaika on 1-14 vuorokautta. Koronavirus tarttuu mahdollisesti jo 1-2 päivää ennen oireiden alkua ja tartuttavuus jatkuu arviolta noin viikon. Myös oireeton voi tartuttaa.

Henkilökunnan altistumista työssä Covid-19 -tartunnalle, arvioidaan THL:n lähikontaktialtistumisen kriteerien perusteella:

- Yli 15 minuuttia kestävä kohtaaminen kasvotusten alle 2 metrin etäisyydellä.
- Fyysinen kontakti
- Suojautumaton kontakti COVID-19-tapauksen eritteisiin
- Yli 15 minuutin oleskelu suljetussa tilassa, esimerkiksi samassa työ-, kokous-, tai odotustilassa.
- Henkilökunta, joka on hoitanut COVID-19-tapausta ja/tai käsitellyt COVID-19-näytteitä ilman asianmukaista suojautumista

Epäilyistä ja varmistuneista koronavirus tapauksista ilmoitetaan joka päivä aluepäällikölle, joka ilmoittaa johtajalle ja turvallisuus@eteva.fi -postiin (uudet tapaukset ja kaikki sairastuneet asiakkaat).

Koronaepäily syntyy, jos yhdellä tai useammalla asukkaalla ja/tai työntekijällä todetaan lyhyen ajan sisällä alkaneita hengitystieinfektion oireita tai ripulia ja/tai vatsakipua, joille ei ole muuta ilmeistä syytä. Tyypillisiä hengitystieoireita ovat yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus. Lisäksi voi olla nenäoireita, kuten nuha, nenän tukkoisuus tai haju- ja makuaistin muutos. Yleisoireena voi esiintyä lihaskipuja ja/tai päänsärkyä, yleistilan laskua.

2.1 Asiakastyö

- Asiakasta, jolla epäillään korona tartuntaa, **hoidetaan omassa huoneessa**. Muiden asiakkaiden liikkumista yhteisissä tiloissa rajoitetaan mahdollisuuksien mukaan, kunnes tapaus on selvitetty.
- Asiakkaan lähihoidossa noudatetaan tavanomaisia-, kosketus- ja pisaravarotoimia ja **käytetään FFP2 – hengityssuojainta**. Varotoimia aloitetaan noudattaa heti kun koronaepäily herää, vaikka testitulokset ei olisi vielä valmis.
- **Konsultoidaan** ensisijaisesti **oman kunnan tartuntatautiyksikköä** koronavirusinfektion näytteenotosta. Kaikista asukkaista ja työntekijöistä, joilla oireiden perusteella epäillään COVID-19 –infektiota, otetaan koronanäytteet. Mikäli täältä ei saada apua/ohjausta soimitaan Päivystysapuun (valtakunnallinen) p. 116 117, jossa tehdään hoidon tarpeen arvio.
- Jos asiakkaan yleisvointi on heikentynyt, vuorossa oleva ohjaaja/sairaanhoitaja konsultoi asiakkaan lähettämistä sairaalahoitoon paikallista tartuntatauti- tai infektio lääkäriä. Turhia siirtoja eri yksiköiden välillä pyritään välttämään epidemiatilanteessa. Jos asiakas lähetetään sairaalaan korona-epäilyn takia, toimintayksikkö ilmoittaa siitä päivystävään sairaalaan.
- Myös **oireettomia altistuneita hoidetaan tavanomaisin sekä pisaravarotoimin**, käytetään FFP2- suojaimia lähihoidossa ja mahdollisten korona-oireiden ilmaantumista seurataan.
- **Rajoitetaan yhteisten tilojen käyttöä**, jos yksikössä on oireilevia asukkaita.
- Altistuneiden kartoitus aloitetaan heti tartuntaepäilyn tullessa tietoon.

30.9.2022

2.2 Henkilöstö

Oireeton koronaan altistunut työntekijä **voi tulla töihin, jos hänellä on riittävä immuunisuoja**. Riittävä suoja on tällä hetkellä kaksi rokotetta tai sairastettu covid-19 alle kuusi kuukautta aiemmin ja saanut yhden covid-19-rokotteen tai sairastettu covid-19-tauti kuuden (6) kuukauden sisällä.

Oireeton koronaan altistunut työntekijä **voi halutessaan testata itsensä** koronan varalta työnantajan hankkimilla pikatesteillä, jotta oireettomat koronapositiiviset löydetään ja estetään viruksen leviäminen.

Henkilöstön sairastuessa otetaan yhteyttä esihenkilöön. Työntekijä voi tehdä **koronabotti.hus.fi** (Uusimaa) tai **Omaolo.fi** (Kanta-Häme ja Päijät-Häme)-palveluissa oirekartoituksen ja hakeutua koronatestiin julkisen terveydenhuollon yksikköön. Sairauspoissaolojen osalta toimitaan poissaolo-ohjeen mukaisesti.

2.3 Suojautuminen

- Noudatetaan tavanomaisia-, kosketus- ja pisaravarotoimia. Paikallinen kunnan tartuntatautiyksikkö voi antaa toimintayksikölle tarkemmat ohjeet suojautumisesta.
- **Käytetään FFP2 hengityksensuojaimia.**
 - ne henkilöt, jotka eivät pysty käyttämään lähihoitotilanteissa tavallista FFP2 suojainta, silloin he valitsevat venttiilisen FFP2 hengityksensuojaimen sekä visiirin.
- Käytetään suojalaseja tai kasvot peittävä visiiriä FFP2 hengityksensuojaimen lisäksi.
- asiakkaiden ollessa oireettomia, silmäsuojia/visiiriä voi käyttää useampaan kertaan, huolehtien puhdistuksesta jokaisen käyttökerran jälkeen
- asiakkaiden ollessa oireilevia, silmäsuoja/visiiri on kertakäyttöinen

- Käytetään suojatakia. Jos pitkähihaista suojatakia ei ole, käytetään lyhythihaisen työasun päällä suojaesiliinaa. Tällöin myös käsivarret on desinfioitava riisumisen jälkeen.
- Tarvittaessa muovinen esiliina. Muovista esiliinaa tarvitaan oireisen asiakkaan hoidossa, jos suojatakki ei ole nestettä läpäisemätön tai -hylkivä. Jos käytetään hihatonta esiliinaa suojatakin sijaan, on myös käsivarret desinfioitava riisumisen jälkeen.
- Käytetään suojakäsineitä

3 Toiminta yksikössä, kun on todettu koronaviruksen aiheuttama infektio

3.1 Asiakastyö

- Asiakas, jolla on koronatartunta, **hoidetaan yhden hengen huoneessa.**
- Asukkaiden **liikkumista huoneidensa ulkopuolella rajoitetaan** mahdollisuuksien mukaan ja yleisten tilojen käyttöä vältetään. Tiedota lisävarotoimista asukashuoneen ovella. Eristyksen keston määrittää aina kunnan tartuntatautilääkäri. Eristyksen purkaminen edellyttää, että asiakas on ollut oireeton.
- Yksikön sisällä pyritään mahdollisuuksien mukaan huolehtimaan siitä, että työvuorossa vain tietty/tietyt työntekijät ovat kontaktissa tiettyjen asukkaiden kanssa, jotta kontaktit jäävät mahdollisimman vähäisiksi.
- Jos **asiakkaan yleisvointi on heikentynyt**, vuorossa oleva ohjaaja/sairaanhoitaja konsultoi asiakkaan lähettämistä sairaalahoitoon paikallista tartuntatauti- tai infektio lääkäriä. Turhia siirtoja eri yksiköiden välillä pyritään välttämään epidemiatilanteessa. Jos asiakas lähetetään sairaalaan korona-epäilyn takia, toimintayksikkö ilmoittaa siitä päivystävään sairaalaan.
- Jos yksikössä todetaan epidemia, asiakkaalla on koronavirusinfektio tai oireisia asiakkaita/ henkilökunnan jäseniä on useita, kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri koordinoi toimintaa. Epidemian päättymisestä ilmoitetaan tartuntatautiyksikköön.

3.2 Suojautuminen

- Noudatetaan tavanomaisia- kosketus- ja pisaravarotoimia. Paikallinen kunnan tartuntatautiyksikkö antaa toimintayksikölle mahdollisesti tarkemmat ohjeet suojautumisesta.
- Käytetään **FFP2**-hengityksensuojainta
 - ne henkilöt, jotka eivät pysty käyttämään lähihoitotilanteissa tavallista FFP2 suojainta, silloin he valitsevat venttiilisen FFP2 hengityksensuojaimen sekä visiirin.
- Käytetään **kertakäyttöisiä** suojalaseja tai kasvot peittävää visiiriä
- Käytetään **kertakäyttöistä suojatakia tai suojahaalaria.**
- Käytetään tarvittaessa muovista esiliinaa. Muovista esiliinaa tarvitaan oireisen asiakkaan hoidossa, jos suojahaalari ei ole nestettä läpäisemätön tai -hylkivä.
- Käytetään suojakäsineitä
- Käytetyille suojaimille tulee olla roskakori sekä asiakashuoneen sisä -että ulkopuolella. Suojainten riisumisjärjestyksen mukaisesti osa suojaimista riisutaan asiakashuoneen sisäpuolella ja osa ulkopuolella. **Tarkemmat ohjeet suojainten hävittämisestä annetaan paikallisesta tartuntatautiyksiköstä.** Eritteitä ja eritteisiä jätteitä käsiteltäessä toimitaan siten, ettei synny aerosoleja tai roiskeita. Jätteet pakataan kahteen pussiin ja huolehditaan, että ulommainen pussi pysyy puhtaana.

4 Suojaimet

4.1 Suojainten käyttö erityistilanteissa

Mikäli **kirurgisen suu-nenäsuojan käyttö aiheuttaa ongelmia** työntekijästä tai asiakkaasta johtuvista syistä, on esihenkilön ja työntekijän yhdessä arvioitava seuraavia vaihtoehtoja:

- Kirurgisen suu-nenäsuojan sopivuuden varmistaminen

30.9.2022

- avaa suojauspaketti ja ota suojaimet puhtain käsin tuulettamaan puhtaaseen tilaan pariin päiväksi, jonka jälkeen niiden sopivuutta kokeillaan uudelleen
- kokeile työnantajalla käytössä olevia eri toimittajien suu –nenäsuojaimia (esihenkilö selvittää sopimustoimittajilta saatavuuden eri malleista)
- vaihda kuminauhallinen suu-nenäsuojus nauhoilla solmittavaan suojaimeen (esihenkilö selvittää sopimustoimittajilta saatavuuden)
- Itse hankitun suojaimeen käyttö. Jos edellä olevista vaihtoehdoista ei löydy ratkaisua, ja työntekijä haluaa käyttää itse hankkimiaan suojaimia, niiden tulee olla eurooppalaisen standardin EN 14683:2019 vaatimuksen mukaisia CE-merkittyjä suojaimia. Esihenkilön tulee tarkistaa, että suojaimet ovat vaatimusten mukaisia ja kirjata asia kustannuspaikan riskienarviointiin.
- **Kangasmaskia ei käytetä työssä.**
- **FFP 2 –suojainta käytetään aina aerosoleja tuottavien toimenpiteiden yhteydessä**, riippumatta siitä, onko sillä hetkellä tartuntoja toimintayksikössä. Aerosolia tuottavia toimenpiteitä ovat liman avoin imu hengitysteistä (sisältää trakeostomian hoidon), nebulisaattorihoito (spira ym.) ja elvytys. FFP2-hengityksensuojainta käytetään aerosolia tuottavan toimenpiteen jälkeen vielä 30 min ajan, mikäli työntekijä on huoneessa.
- **FFP2- venttiilillisen maskin käyttäjät käyttävät lisäksi visiiriä.** Tällä pyritään suojaamaan asiakasta.

4.2 Suojainten pukeminen ja riisuminen

Suojainen pukeminen	Suojainten riisuminen
1) Desinfioi kädet 2) Suojatakki/-haalari 3) FFP2 ja silmäsuoja/ visiiri 4) Desinfioi kädet 5) Suojakäsineet	1) Riisu suojahaalari ja suojakäsineet 2) Desinfioi kädet 3) Poista silmäsuojus/visiiri ja FFP2 4) Desinfioi kädet

Suojainten pukeminen ennen asiakashuoneeseen menoa:	Suojainten riisuminen ennen asiakashuoneesta poistumista:
1) Desinfioi kädet 2) Pue hihallinen suojaesiliina /suojahaalari 3) Pue FFP2–hengityksensuojain, tarkista sen tiiviys 4) Pue hiussuojain ja sitten suojalasit/visiiri 5) Desinfioi kädet 6) Suojakäsineet puetaan asukashuoneessa	1) Riisu suojakäsineet ja hihallinen suojatakki /suojahaalari 2) Desinfioi kädet 3) Poista suojalasit/visiiri ja sitten hiussuojain 4) Desinfioi kädet 5) Poista FFP2-hengityksensuojain asiakashuoneen ulkopuolella 6) Desinfioi kädet

4.3 Suojainten hankinta

1.1.2022 alkaen toimintayksiköt hankkivat suojaimet suoraan sopimustoimittajana toimivan Suomen Medituotteen kautta. Hallintopalvelut avustavat hankinnoissa tarvittaessa, mikäli sopimustoimittajalla on tuotteiden osalta pitkäkestoisia saatavuusongelmia.

Jokainen toimintayksikkö varmistaa, että yksikössä on normaaliin suojautumiseen riittävästi seuraavia suojautumisvälineitä:

30.9.2022

- kirurginen suu-nenäsuojuksia
- erityistilanteita varten FFP 2 hengityssuojaimia
- silmäsuojaimet/visiirit
- pitkähihaisia suojaesiliinoja/suojahaalareita
- suojamyssyjä
- kertakäyttökäsineitä
- käsidesiä

Lisäksi jokaisessa toimintayksikössä on varalla myös hätäapupakkaus, joka otetaan käyttöön akuutissa tartuntatautilanteessa. Pakkauksessa on kuuden (6) päivän suojarusteet.

Pakkauksen sisältö;

- 200 kpl Kirurginen suu-nenäsuojusta
- 50 kpl hengityssuojaimia FFP 2
- 50 silmäsuojaimia tai visiirejä
- 80 pitkähihaisia suojaesiliinoja/suojahaalareita
- 80 suojamyssyjä

5 Koronatestaus

5.1 Asiakkaiden koronatestaus

Näytteenoton aiheellisuudesta sairaanhoitaja/vuorossa oleva ohjaaja konsultoi kunnan tartuntataudeista vastaavaa lääkäriä, joka voi tarvittaessa konsultoida Mobiiliyksikön infektiolääkäriä. Päivystysaikaan konsultoidaan kunnan päivystävää terveyskeskuslääkäriä.

- Näyte otetaan yksikössä, mikäli asukkaalla ei sairaalahoitoa tarvetta tai on rajattu sairaalahoitoa ulkopuolelle. Näytteenotossa hyödynnetään mahdollista liikkuvaa näytteenottopalvelua, jos sellainen kunnassa on.
- Jos tapauksia on useita, kaikista pyritään ottamaan näyte. Koronadiagnoosin varmistus auttaa yksikön asiakkaiden toiminnan suunnitelmassa sekä hoitohenkilökunnan ja muiden asukkaiden altistusten ja karanteenin määrittämisessä.
- Jos toimintayksiköstä yksi asukas tai työntekijä osoittautuu koronapositiiviseksi, laajennetaan testaus tarvittaessa nopeasti kaikkiin asiakkaisiin ja koko henkilökuntaan. Oireiden jatkuessa testausta toistetaan. Toimenpiteet suunnitellaan tulosten mukaisesti. Tartunnan saaneet eristetään, ja altistuneet ohjataan karanteeniin.

5.2 Henkilöstön koronatestaus pikatesteillä

- Etevassa on käytössä SARS-CoV-2 antigeenipikatestejä yksiköiden käyttöön. Näitä pikatestejä voi käyttää **oireeton, täydellä rokotussarjalla suojattu työntekijä**, joka on altistunut joko vapaa-ajalla tai töissä koronavirukselle. Pikatesti **ei ole tarkoitettu asiakkaiden testaukseen**.
- Pikatestien teko työpaikalla on täysin **vapaaehtoista**. Työnantaja ei voi velvoittaa sinua tekemään pikatestiä. Testin tulos on henkilökohtainen terveystieto, jota sinun ei tarvitse kertoa työnantajalle.
- Testauksella on **tarkoituksena löytää piilossa olevat koronapositiiviset ja estää viruksen leviäminen**. Oireeton korona positiivinen henkilö on yhtä tartuttava kuin oireinenkin.
- Pikatesti tulos on luotettavampi, jos testi toistetaan 2-3 päivän välein.
- Jos testi näyttää positiivista, tulee hakeutua PCR-testiin ja noudattaa tartunnan saaneiden valtakunnallisia ohjeita.
- Jos sinulla on koronaan liittyviä tai muita hengitystieoireita, niin **et tule sairaana töihin**. Hakeudut PCR-testiin ja toimit Etevan sairaspöytäkäytäntöjen mukaisesti.
- 1.5.2022 alkaen voi pikatestejä ostaa yksiköiden käyttöön osoitetulla maksukortilla (S-Business oy) S-ryhmän päivittäistavara-kaupoista.
- Pikatestejä hankitaan sen hetkiseen tarpeeseen tuleva määrä, ei varastoitavaksi.
- Testit tiliöidään 4540 Hoitotarvikkeet.

5.3 Henkilöstön näytteenoton ajanvaraus Koronabotissa

- Sote-henkilöstölle on varattu erillisiä aikoja kunnissa toimiviin tiettyihin näytteenottopisteisiin tilattavaksi Koronabotista. (koronabotti.hus.fi) (Uusimaa)
- Oirekyselyn alussa on vastattava kysymykseen ”*Työskenteletkö sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla?*” à ”*Kyllä*”.
- Näytteenoton ajanvaraus itselle tehdään aina henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Vaikka olisit sote-ammattilainen, tunnistaudu silti **henkilöasiakkaana**.
- Ajan voi varata mistä tahansa toimipisteestä mihin aikoja on avattu.

30.9.2022

Poikkeustilanteessa aluepäällikkö on yhteydessä työsuojelu- ja riskienhallintapäällikköön testauksen saavutettavuuden varmistamiseksi.

6 Muita ohjeita COVID19 –positiivisen tai –epäilyn hoitoon

6.1 Ruokailu

Ruokailuvälineiden suhteen normaalikäytäntö. Avustettaessa riskiryhmään kuuluvaa tai altistunutta/sairastunutta asukasta ruokailussa suojaudutaan pisara- ja kosketusvarotoimien mukaisesti.

6.2 Siivous

COVID-19 -positiivisen tai –epäilyn asukkaan päivittäisessä siivouksessa pyyhitään asiakashuoneen kosketuspinnat (esim. ovenkahvat, sängynlaidat, yöpöydät) desinfiointiaineella ja poistetaan roskat. Desinfiointiaineita ovat esimerkiksi Oxivir Plus 3,5%, Klorilli 1000 ppm, Virkon 1% ja pintadesinfektioliinat. Eritetahrat (myös yskökset) poistetaan välittömästi eritetahradesinfektioaineella (Oxivir Plus, Virkon 1% ja Klorilli 1000 ppm).

Viikkosiivous toteutetaan noudattaen kosketus- ja pisaravarotoimia. Kts yllä ”Varotoimet koronavirusepäilyn ja koronaviruspositiivisen hoidossa”. Viikkosiivous toteutetaan yleispuhdistusaineella, eritetahrat poistetaan eritetahra -desinfektioaineella. Siivouksessa käytetään kestokäsineitä ja ne desinfioidaan jokaisen käyttökerran jälkeen ja ne säilytetään erillisessä astiassa. [Katso TTL:n ohjeet](#)

Loppusiivous toteutetaan, kun potilaan kosketus- ja pisaravarotoimet päättyvät. Loppusiivous toteutetaan noudattaen kosketus- ja pisaravarotoimia.

6.3 Jätteiden käsittely

Eritteitä ja eritteisiä jätteitä käsiteltäessä toimitaan siten, ettei synny aerosoleja tai roiskeita. Jätteet pakataan kahteen pussiin ja huolehditaan, että ulommainen pussi pysyy puhtaana.

6.4 Likapyykki

Käytössä on sulavia pyykkipusseja. Pyykki laitetaan pyykkipussiin asiakkaan huoneessa (henkilöstön vaatteet siinä tilassa, missä ne riisutaan) ja pussi suljetaan vesiliukoisella nauhalla. Säilytä pussit pakkauksissaan kuivassa tilassa. Kääri valuvan märkä pyykki kuivemman likapyykin sisään. Älä täytä pussia liian täyteen. Täytetyt pussit eivät saa kastua säilytyksen eikä kuljetuksen aikana. Pesun edetessä pussi muuttuu biologisesti pilkkoutuvaksi. Pussista ei jää jäännöksiä pesukoneeseen. Sulavia pyykkipusseja on hankittavissa Medituotteen valikoimista.

Pyykki pestään yksikössä. Pyykki viedään suoraan pesukoneeseen pölyttämättä sitä ja huolehditaan ettei pyykillä tai suojaimilla kontaminoida esim. ovenkahvoja. Kun pesukone on täytetty, koneen ovi suljettu ja kone käynnistetty, kaikki pesukoneen kosketuspinnat pyyhitään pesevällä desinfektioaineella.

Pyykki pestään vähintään 60 asteessa. Mikäli tämä ei onnistu, voidaan käyttää pesuaineen lisänä desinfioivaa pesuainetta (esim. Erisan Oxy).

30.9.2022

Asiakaspyykin ja työntekijöiden pyykin välillä pestään kone tyhjänä 90 asteessa. Suojahaalarin alla käytettävä T-Paita pestään työpaikalla pesupussissa. Asiakkaiden ja henkilöstön pyykkien välillä pestään kone tyhjänä 90 asteessa. Haalareiden alla pidettävät omat housut voi pestä myös työpaikalla.

6.5 Tutkimus- ja hoitovälineistö

Asiakashuoneeseen varataan hoidossa tarvittavat välineet. Kertakäyttöisiä välineitä käytetään aina, kun se on mahdollista. Monikäyttöiset hoitovälineet puhdistetaan ja desinfioidaan ennen poisvientiä pyyhkimällä ne huolellisesti desinfektioaineella (Oxivir Plus, Virkon 1% tai Klorilli).

Yhteystiedot

Työsuojelu- ja riskienhallintapäällikkö Kati Hyttinen, 040 304 7033, Marja Jyrkinen, 040 304 7014

Tartuntatautiyksiköiden yhteystiedot:

HUS Mobiiliyksikkö (hygieniahoitaja Jaana Vatanen 050 4270982, mobiiliyksikko@hus.fi)

Kanta-Hämeen alueella; Hygieniahoitaja Merja Fellman, 03 629 2211

Päijät-Hämeen alueella; Hygieniahoitaja Anne Reiman, 044 719 5525

Valtakunnallinen puhelinneuvonta antaa yleistä tietoa koronaviruksesta. Numero on 0295 535 535. Puhelinneuvonta on auki arkipäivisin klo 8-21 ja lauantaisin klo 9-15.

Lähteet

Mobiiliyksikön ohjeet | HUS

<https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19/koronavirustauti-milloin-on-hakeuduttava-hoitoon>

<https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/ajankohtaista/koronavirus-ja-vammaispalvelut>